Niveau(x) d'enseignement: 4 Numéro EDUQ : 8270942
Centre d'intérêt: 240

Hôtel-Dieu de Roberval (Québec) Département de santé communautaire.

Enquête-sondage sur les maladies vénériennes : comparaison des résultats : santé scolaire / Hôtel-Dieu de Roberval, Département de santé communautaire. -- Roberval : Le Département, 1976.
4, 8 f. ; 28 cm.

Cote Dewey: 612.6'007'09714/H832e Cote LC: HQ/57.6/.C38

Descripteur(s): *Education sexuelle *Maladie vénérienne *Secondaire (Niveau)

Le document présente les résultats comparés d'une enquête par questionnaire portant sur les maladies vénériennes, enquête effectuée une première fois en 1975 puis une deuxième fois en 1976 auprès d'étudiants du secondaire. En 1976, les étudiants avaient assisté préalablement à une séance d'information sur le sujet, ce qui n'avait pas été le cas l'année précédente. Il s'agit donc de mesurer l'évolution du niveau de connaissance entre les groupes des deux années.

En 1975, l'enquête par questionnaire s'est déroulée auprès de 392 étudiants, les deux tiers inscrits en secondaire III et les autres en secondaire IV. En 1976, les 443 étudiants qui avaient à remplir le questionnaire étaient tous inscrits en secondaire IV.

Comme il fallait s'y attendre, le groupe de 1976 fait montre de connaissances nettement supérieures à celles du groupe de l'année précédente, ce qui tendrait à démontrer l'importance de fournir aux étudiants une information sérieuse sur le sujet.

Type de document: r
Région(s) administrative(s): 02
Auteur de l'analyse: ar

EDUQ 8270942

SANTE SCOLAIRE

Enquête-sondage sur les maladies
vénériennes: comparaison
des résultats.

D.S.C.
Hôtel-Dieu de Roberval
Juin 1976

Dans ce texte sont présentés les résultats comparés de l'enquête par questionnaire portant sur les maladies vénériennes effectuée une première fois en 1975 et une deuxième fois en 1976.

En 1976 les étudiants qui ont répondu au questionnaire avaient, la même journée, assisté à une séance d'information donnée par l'infirmière scolaire sur les maladies vénériennes. Les étudiants de 1975 n'avaient pas reçu une telle information.

Nous pourrons donc mesurer la différence dans le niveau de connaissance des deux groupes. Nous devons bien sûr nous attendre à ce que le niveau de connaissance du groupe ayant reçu de l'information soit supérieur à celui de l'autre groupe.

Une différence dans l'échantillon de 1976 c'est que tous les étudiants choisis étaient en secondaire IV (contrairement à 1975 où 66.5% des répondants étaient de secondaire III. Mais lors de la compilation des résultats de l'enquête de 1975 on n'a pu constater aucune différence significative dans le niveau de connaissance des étudiants de secondaire III et ceux de secondaire IV. Il est donc très improbable qu'une telle différence puisse exister avec les étudiants de 1976.

Faisons maintenant la comparaison entre les résultats de 1975 et ceux de 1976 (voir annexe I). Nous ne soulignerons que les points les plus saillants.

- A la question #4 qui demandait de nommer la maladie vénérienne la plus courante une différence notable est à remarquer: alors qu'en 1975 seulement 2.8% des répondants à cette question ont nommé la gonorrhée la proportion est de 83.6% en 1976.

- Au questions #5 et #6 ce qui demandaient de reconnaître certains symptômes des M.V. on s'aperçoit que les étudiants ayant reçu de l'information ont beaucoup mieux répondu que les autres. Par exemple, le

.../2

symptôme "sensation de brûlure au moment d'uriner" a été identifié par 51.5% des répondants de 1975 contre 90.3% de ceux de 1976.

- A savoir si on peut contracter une M.V. au contact des sièges de toilette 90.1% ont bien répondu par la négative en 1976 contre 53.5% en 1975. De plus, les réponses "ne sais pas" représente seulement 2.5% des étudiants "informés" contre 11.8% des étudiants non informés (voir question #7).
- A la question #8 qui demandait si c'est à partir d'un microbe qu'une M.V. se développe on s'aperçoit que le groupe de 1976 (qui avait reçu de l'information par l'infirmière scolaire) a moins bien répondu que le groupe de 1975 (sans information): 77.0% ont répondu "oui" en 1975 contre 74.3% en 1976. Mais si parmi le groupe de 1976 on distingue deux sous-groupes composés des étudiants de St-Félicien et de Normandin on constate, chose étonnante, que seulement 59.9% des étudiants du sous-groupe de St-Félicien ont bien répondu alors que le taux de bonnes réponses est de 90.7% dans le sous-groupe de Normandin (voir tableau ci-après).

Réponse à la question #8	Sous-groupe de St-Félicien		Sous-groupe de Normandin		Total	
oui	142	59.9% (<)	187	90.7% (>)	329	74.3%
non	53	22.3%	12	5.7%	65	14.7%
ne sais pas	42	17.7%	7	3.3%	49	11.1%
TOTAL	237	100.0%	206	100.0%	443	100.0%

On découvre en outre que la proportion de oui dans le sous-groupe de St-Félicien est statistiquement et significativement (selon le test de proportion avec $P < 0.05$) plus petite que la proportion totale et que celle du sous-groupe de Normandin est significativement plus grande.

On peut expliquer ces résultats par la façon dont l'information éduca-

.../3

tive a été transmise par chacune des infirmières des sous-groupes de St-Félicien et de Normandin. On sait que l'infirmière scolaire devait préparer elle-même le contenu de son information ce qui fait que des groupes d'étudiants d'écoles différentes n'ont pas reçu nécessairement la même information éducative. Il faudra se rappeler ce fait dans la suite de l'analyse des résultats.

Dans le cas présent on peut supposer que le groupe de St-Félicien n'a pas reçu d'information concernant le développement des M.V. à partir d'un microbe alors que le groupe de Normandin aurait été informé à ce sujet.

- Il est faux de dire que les M.V. atteignent surtout les gens âgés de plus de 25 ans (question #10) selon 90.5% des étudiants de 1976 et seulement 72.8% de ceux de 1975 (le pourcentage de "ne sais pas" est passé, pour cette question, de 19.2% en 1975 à 7.0% en 1976).

- La connaissance des conséquences d'une M.V. (question #11) est suffisante chez 65.7% des étudiants ayant répondu en 1976 (95.1% à Normandin et 40% à St-Félicien) mais chez 15.8% seulement de ceux ayant répondu en 1975.

- La connaissance est bien meilleure également chez les étudiants de 1976 en rapport à la question de savoir s'il est possible de contracter une M.V. plus d'une fois (question #12). En effet, 87.3% de ces étudiants ont répondu "oui" alors qu'en 1975 cette proportion était de 51.5%.

- En 1975, 37.3% des étudiants ne savaient pas qu'on ne peut se guérir soi-même d'une M.V. (question #14). En 1976 cette proportion est tombée à 7.0% seulement. Cependant la proportion est très différente à St-Félicien (10.5%) et à Normandin (2.9%).

- A la question #15 qui demandait s'il est vrai que la médecine n'a pas encore découvert de traitement efficace pour guérir les M.V., 75.6% des répondants en 1976 ont répondu "faux" contre seulement 47.8% en

1975. Encore là les sous-groupes de Normandin et de St-Félicien se distinguent notablement avec des pourcentages respectifs de 89.8% et de 63.2%.

- En 1975, 52% des étudiants ont répondu qu'ils ne savaient pas s'il existe des examens de laboratoire à subir face à une M.V. (question #16). Cette proportion a diminué de la moitié en 1976 pour se situer à 26% (mais la proportion est de 10.6% à Normandin et de 39.2% à St-Félicien: cette forte différence entre les deux sous-groupes laisse supposer qu'à Normandin l'information éducative qui a été transmise était sans doute reliée au questionnaire).

- En 1975, seulement 33% des répondants savaient qu'on ne peut pas se faire vacciner contre les M.V. En 1976, 84.2% des étudiants savaient cette chose (question #19). A Normandin la proportion monte à 83.2% et à St-Félicien elle descend à 76.3%.

- La question #25 nous révèle que les répondants de 1976 sont moins nombreux à avoir déjà vu une émission de télévision sur les M.V. (23.3% contre 37.5% en 1975). Malgré ce fait ces répondants ont une meilleure connaissance due à l'information éducative qu'ils ont reçue.

ANNEXE I

Résultats comparés

Questions		Réponses en 1975		Réponses en 1976	
		Nb	%	Nb	%
1) Age: - 14 - 16 ans:		293	(74,7)	308	(69,5)
- 17 - 18 ans:		98	(25,0)	129	(29,1)
- 19 - 20 ans:		1	(0,3)	6	(1,4)
	Total:	392	(100,0)	443	(100,0)
2) Sexe:	- Masculin:	156	(40,3)	190	(42,9)
	- Féminin:	231	(59,7)	252	(56,9)
3) Niveau scolaire:	- Sec. III:	260	(66,5)	0	(0,0)
	- Sec. IV:	131	(33,5)	443	(100,0)
4) Maladie vénérienne	- syphilis:	93	(23,7)	16	(11,0)
La plus courante:	- gonorrhée:	11	(2,8)	122	(83,6)
	- autres:	287	(73,2)	8	(5,4)
		391		146	
	- oui:		(2,8)	140	(95,9)
	- non:		(97,2)	6	(4,1)
				146	

.../2

Questions	Réponses			
	en 1975		en 1976	
	Nb	%	Nb	%
5) Symptômes d'une M.V.:				
a) plaie aux organes génitaux:				
- oui:		(79.4)	400	(90.3)
- non:		(6.2)	26	(5.9)
- ne sais pas:		(14.4)	17	(3.8)
b) vômissement et perte d'appétit:				
- oui:		(5.8)	52	(11.7)
- non:		(67.4)	345	(77.9)
- ne sais pas:		(27.6)	47	(10.6)
c) sensation de brûlure au moment d'uriner:				
- oui:		(51.5)	400	(90.3)
- non:		(22.4)	17	(3.8)
- ne sais pas:		(26.1)	26	(5.9)
d) bouton et rougeur sur le corps:				
- oui:		(24.0)	289	(65.2)
- non:		(48.0)	95	(21.4)
- ne sais pas:		(28.0)	59	(13.3)
6-) Pertes blanches signifie maladie vénérienne pour la femme:				
- oui:		(37.7)	60	(13.5)
- non:		(53.3)	319	(72.0)
- ne sais pas:		(11.7)	64	(14.4)

.../3

Questions	Réponses			
	en 1975		en 1976	
	Nb	%	Nb	%
7) Contracter une M.V. au contact de sièges de toilette:				
- oui:		(34.8)	33	(7.4)
- non:		(53.5)	399	(90.1)
- ne sais pas:		(11.8)	11	(2.5)
8) Une M.V. se développe à partir d'un microbe:				
- oui:		(77.0)	329	(74.3)
- non:		(10.5)	65	(14.7)
- ne sais pas:		(12.5)	49	(11.1)
9) Quelle personne peut être atteinte d'une M.V.:				
- celle qui a régulièrement des relations:		(9.8)	47	(10.6)
- celle qui a eu des relations avec un étranger:		(59.1)	333	(75.2)
- celle qui ne se lave pas les parties sexuelles:		(23.8)	38	(8.6)
- ne sais pas:		(7.4)	25	(5.6)
10) Les M.V. atteignent surtout les gens âgés de plus de 25 ans:				
- vrai:		(8.0)	11	(2.5)
- faux:		(72.8)	401	(90.5)
- ne sais pas:		(19.2)	31	(7.0)

.../4

Questions	Réponses en 1975 Nb	Réponses en 1975 %	Réponses en 1976 Nb	Réponses en 1976 %
11) Conséquences d'une M.V. non traitée:				
- bonne connaissance:		(15.8)	291	(65.7)
- connaissance insuffisante:		(84.2)	152	(34.3)
12) Avoir une M.V. une deuxième fois:				
- oui:		(51.5)	387	(87.3)
- non:		(9.8)	19	(4.3)
- ne sais pas:		(44.2)	37	(8.4)
13) Avec une M.V. la première chose à faire:				
- attendre quelques jours:		(10.1)	34	(7.7)
- immédiatement chez le médecin:		(77.2)	382	(86.2)
- en parler à quelqu'un:		(11.9)	20	(4.5)
- autre:		(0.8)	7	(1.6)
14) Se guérir soi-même d'une M.V.:				
- oui:		(11.0)	68	(15.3)
- non:		(51.7)	344	(77.6)
- ne sais pas:		(37.3)	31	(7.0)

.../5

Questions	Réponses en 1975 Nb	en 1975 %	en 1976 Nb	en 1976 %
15) Aucun traitement efficace pour les M.V.:				
- vrai:		(15.9)	51	(11.5)
- faux:		(47.8)	335	(75.6)
- ne sais pas:		(36.2)	57	(12.9)
16) Examens de laboratoire:				
- oui:		(39.2)	281	(63.2)
- non:		(9.3)	48	(10.8)
- ne sais pas:		(51.5)	115	(26.0)
17) De bonnes habitudes alimentaires favorisent la guérison:				
- oui:		(19.0)	55	(12.4)
- non:		(52.0)	313	(70.7)
- ne sais pas:		(28.9)	75	(16.9)
18) Pour enrayer les M.V. il est nécessaire que tous les malades:				
a) se fassent traiter:				
- nécessaire:		(85.2)	401	(90.5)
- pas nécessaire:		(5.2)	23	(5.2)
- ne sais pas:		(9.6)	19	(4.3)
b) déclarent la source d'infection:				
- nécessaire:		(72.4)	364	(82.2)
- pas nécessaire:		(20.8)	50	(11.3)
- ne sais pas:		(6.8)	29	(6.5)

.../6

Questions	Réponses en 1975 Nb	en 1975 %	en 1976 Nb	en 1976 %
c) s'abstiennent de relations sexuelles:				
- nécessaire:		(48.6%)	224	(50.6%)
- pas nécessaire:		(32.0%)	174	(39.3%)
- ne sais pas		(19.3%)	45	(10.2%)
19) On peut se faire vacciner contre les M.V.:				
- oui:		(11.5%)	16	(3.6%)
- non:		(33.0)	373	(84.2%)
- ne sais pas:		(55.4%)	44	(9.9%)
20) Mesures d'hygiènes pour prévenir les M.V.:				
a) condom pour le garçon:				
- oui:		(32.9%)	235	(53.0%)
- non:		(12.8%)	57	(12.9%)
- ne sais pas:		(54.3%)	151	(34.1%)
b) lavage des organes génitaux:				
- oui:		(59.7%)	215	(48.5%)
- non:		(13.6%)	117	(26.4%)
- ne sais pas:		(26.4%)	127	(28.7%)
c) uriner après les relations sexuelles:				
- oui:		(17.6%)	129	(29.1%)
- non:		(30.2%)	149	(33.6%)
- ne sais pas:		(52.2%)	165	(37.2%)

.../7

Questions	Réponses			
	en 1975		en 1976	
	Nb	%	Nb	%
d) bonnes habitudes alimentaires:				
- oui:		(29.6%)	79	(17.8%)
- non:		(28.6%)	200	(45.1%)
- ne sais pas:		(41.8%)	164	(37.0%)
21) Existe une loi interdisant de divulguer les noms des patients atteints d'une M.V.:				
- oui:		(59.7%)	350	(79.0%)
- non:		(10.0%)	39	(8.8%)
- ne sais pas:		(30.3%)	54	(12.3%)
22) Un membre de la famille vous a-t-il déjà parlé sur les M.V.:				
- oui:		(32.2%)	129	(29.1%)
- non:		(58.4%)	241	(54.4%)
- ne sais pas:		(9.6%)	73	(16.5%)
23) Un ami vous a-t-il déjà parlé à propos des M.V.:				
- oui:		(30.4%)	107	(24.2%)
- non:		(55.6%)	255	(57.6%)
- ne sais pas:		(14.0%)	81	(18.3%)
24) Avez-vous déjà lu quelque chose sur les M.V.:				
- oui:		(43.1%)	202	(45.6%)
- non:		(55.6%)	241	(54.4%)

.../8

Questions	Réponses en 1975 Nb	Réponses en 1975 %	Réponses en 1976 Nb	Réponses en 1976 %
25) Avez-vous déjà vu une émission de TV sur les M.V.:				
- oui:		(37.5%)	103	(23.3%)
- non:		(62.5%)	340	(76.7%)
26) Avez-vous déjà eu une M.V.:				
- oui:		(1.0%)	8	(1.8%)
- non:		(99.0%)	435	(98.2%)
27) Vos connaissances sur les M.V. sont:				
- suffisante:		(4.9%)	133	(30.0%)
- + ou - suffisante:		(30.5%)	215	(48.5%)
- insuffisante:		(64.6%)	71	(16.0%)
- sans réponse:			24	(5.4%)

DB/sj.
1976-08-09